



**OZBEKISTON RESPUBLIKASI
SOG'LIKNI SAQLASH VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT
STOMATOLOGIYA INSTITUTI**



**“YOSH OLIMLAR KUNLARI”
Respublika ilmiy-amaliy anjumani
xalqaro ishtirok bilan
TEZISLAR TO'PLAMI**

**COLLECTION OF ABSTRACTS
“YOUNG SCIENTISTS DAYS”
Republic scientific and practical conference
with international participation**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ
Республиканской научно-практической конференции
с международным участием
“ДНИ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ”**

Toshkent 25 aprel 2023 y.

DESIGN OF DOMESTIC DENTAL IMPLANT. Central Asian journal of medical and natural sciences Volume, 2, 5-12.

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТРЕВОЖНОСТИ ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ

Шоахмедова К.Н., доцент кафедры пропедевтика ортопедической стоматологии. kshoahmedova@mail.ru

Рахимов Б.Г., ассистент кафедры пропедевтика ортопедической стоматологии.

Махмудов М.Б., , ассистент кафедры пропедевтика ортопедической стоматологии

Актуальность исследования. Мнительное отношение людей к стоматологическому приему остается одной из актуальных проблем. Выявление личностных особенностей пациентов ограничена дефицитом времени и отсутствием у врача – стоматолога профессиональной психологической подготовки. Несмотря на достижения современной стоматологии, новейшие технологии лечения, стоматологические манипуляции в сознании людей остаются связанными с негативными эмоциями. Причиной тому – дентофобия.

Цель исследования. Определение уровня тревожности у лиц различных возрастных групп на стоматологическом приеме при помощи модифицированной шкалы Кораха и выявление факторов, оказывающих влияние на формирование страха перед посещением стоматолога.

Материалы и методы. Использованы методы. Клинический, аналитический, статистический.

Результаты исследования. Проведено обследование 44 пациентов обоего пола в возрасте от 17 до 66 лет на базе Студенческой поликлиники РязГМУ г. Рязани. В ходе исследования было сформировано 3 возрастных группы согласно ВОЗ: 1 группа – 18-44, 2 группа – 45-59, 3 группа – 60-74. Пациенты каждой группы проходили анкетирование по адаптированной шкале Кораха. Согласно полученным данным среди пациентов первой возрастной группы (18-44) легкую степень дентофобии имели 18% пациентов, среднюю – 74%, тяжелую – 8%. Среди пациентов второй возрастной группы (45-59) среднюю степень имели 66%, тяжелую – 3%. На третью возрастную категорию приходится 6 % – пациенты имели только среднюю степень дентофобии. Было отмечено, что хирургический прием вызывает наибольшее чувство страха у 52% пациентов, в то время как терапевтический и ортопедический приемы составляли по 2%, остальные 34% пациентов отметили отсутствие страха. Возрастная категория врача – стоматолога также играет свою роль: для 6% пациентов возраст никакой роли не играет, 2% пациентов испытывают страх у стоматологов в возрасте 26-35 лет, 1% пациента опасаются стоматологов в возрасте 46-60 лет, у 3% пациентов вызывает подозрение возрастная категория врача 61-83 года, и 1% пациентов не доверяет врачу, чей

возраст колеблется в пределах 36-45 лет. Факторы, оказывающие влияние на формирование страха перед посещением: отрицательный опыт пациента, некомпетентность врача в выстраивании коммуникативного общения, возрастная категория стоматолога, медиа-фактор. Сборник тезисов призёров научно-практической и научно-теоретической конференций университета 2017-2018 уч. г. 29

Выводы. Важная роль в регуляции психоэмоционального статуса пациента должна принадлежать врачу – стоматологу, который обязан знать азы психологии, обладать навыками коммуникативного общения и уметь найти им применение с учетом индивидуальных особенностей пациента.

1. Кудряшова И.П., Оспельникова Т.П., Ершов Ф.И. Динамика показателей цитокинового профиля при хроническом пиелонефрите // Клин. нефрол. – 2012. – №3. – С. 39-41.

2. Akbarov, A. N., and A. Jumayev. "Hygienic condition of prostheses in patients with partially removable dental prostheses." *Pal Arch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17.6 (2020): 14351-14357.

3. Акбаров, Авзал, Нигора Нигматова, and Комола Шоахмедова. "ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРИЛЕГАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЦИРКОНИЕВЫХ ШТИФТОВ К ПОВЕРХНОСТИ КОРНЯ ЗУБА." *Медицина и инновации* 1.4 (2021): 365-369.

4. Шоахмедова, Комола, etal. "КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК, ОПТИМИЗАЦИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ." *Медицина и инновации* 1.4 (2021): 454-457.) (2020): 29-32.

5. Алиева, Н., etal. "ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК." *Медицина и инновации* 1.4 (2021): 621-624.

6. Алиев, Шовкат Рузиматович, etal. "СУРУНКАЛИ БУЙРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ БИЛАН ОФРИГАН, ДИАЛИЗ ТЕРАПИЯ ОЛАЁТГАН ВА ОЛМАЁТГАН БЕМОРЛАРДА ОФИЗ БЎШЛИГИНИНГ МАҲАЛЛИЙ ИММУНИТЕТ ҲОЛАТИ." *Биология и интегративная медицина* 6 (46) (2020): 84-95.

7. Шоахмедова, К., М. Сабиров, and Ж. Бабаджанов. "ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК НА СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА." *Stomatologiya* 1.3 (76) (2019): 36-40.

8. Акбаров, А., etal. "ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК." *Stomatologiya* 1.3 (76) (2019): 66-70.

9. Шоахмедова, Комола, etal. "КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК, ОПТИМИЗАЦИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ." *Медицина и инновации* 1.4 (2021): 454-457.

10. Лебеденко И.Ю. Ортопедическая стоматология. Алгоритмы диагностики и лечения; Под ред. И.Ю. Лебеденко, С.Х. Каламкаровой. – М.: Мед. информ. агентство, 2012.

11. Мусаева, Р.С. Клинико-лабораторное обоснование выбора средств гигиены полости рта при заболеваниях пародонта у больных сахарным диабетом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – СПб: СПбГМУ, 2009. – 16 с.

ПРИНЦИПЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СТИРАЕМОСТИ ЗУБОВ

*Нуриддинова М.Б студентка 208 гр. стом фак. ТГСИ
Научный руководитель: Шоахмедова К.Н., доцент кафедры протезоведения
ортопедической стоматологии.*

kshoahmedova@mail.ru

*Ташкентский государственный стоматологический институт,
Узбекистан*

Актуальность. Повышенная стираемость зубов (ПСЗ) относится к группе некариозных поражений, распространенность которых в России и экономически развитых странах мира за последние десятилетия резко возросла и составляет от 11,0 до 31,0 % случаев стоматологических заболеваний (Иорданишвили А. К., 2014). Ведущими этиологическими факторами развития данного заболевания являются воздействие химических и абразивных агентов, парафункция жевательных мышц, неполноценность твердых тканей зубов (Vailati F, 2014).

Цель исследования. Разработать способ комплексного лечения пациентов с повышенной стираемостью зубов средней степени тяжести путем материаловедческого физико–механического подхода.

Материал и методы исследования. На этапах клинического исследования проводилась клинико-инструментальная оценка эффективности метода реставрации дефектов твердых тканей зубов с применением вкладок при выраженной степени повышенной стираемости, и оценка эффективности комплексного лечения пациентов с повышенной стираемостью зубов средней степени с применением усовершенствованного алгоритма. В клинической части работы выполнены исследования состояния стоматологического статуса пациентов с повышенной стираемостью зубов, комплексное лечение и динамическое наблюдение. Проведена клиническая оценка качества выполненных реставраций и оценка качества жизни, обусловленного стоматологическим здоровьем до и после комплексного лечения.

Разработан способ лечения пациентов с повышенной стираемостью зубов средней степени, с применением вкладок, повышающий сохранность выполненных реставраций в течение длительного времени. Проведено проспективное, многоцентровое, контролируемое рандомизированное клиническое исследование. Способ рандомизации: сгенерированные таблицы случайных чисел.

Результаты и обсуждение. При анализе эстетических жалоб у пациентов с повышенной стираемостью выявлено преобладание изменений, связанных с внешним видом зубов и изменением нижней трети лица за счет уменьшения

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ИСКУССТВЕННЫМИ КОРОНКАМИ С ОПОРОЙ НА ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ ПРИ ПЕРИИМПЛАНТИТАХ	376
Сафаров М.Т., Салимов О.Р., Широнова Ш. ОЦЕНКА ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ С ЗАМКОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТАХ	379
Шарипов С. С. Набиев К. А. Хабилов Н.Л. COVID-19 БИЛАН ОҒРИГАН ТИШСИЗ БЕМОРЛАРНИНГ ФНУКЦИОНАЛ РЕАБИЛИТАЦИЯСИГА ҚИСҚАЧА АДАБИЁТЛАР ТАХЛИЛИ	381
Махкамова С.Ж, Тошпулатов Ж.А., Рихсиева Д.У СТАБИЛЬНОСТЬ ЦВЕТА ПОЛИМЕРНЫХ БАЗИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ	384
Kamoliddinova L.N., To'rayeva J.SH., Sharofiddinova D.U., Tolipova M.A., CAD/CAM SYSTEMS IN DENTISTRY: CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS	386
Salimov O.R. Tolipova M.A. THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PATIENTS WITH CHRONIC PERAPATITIS	388
Шоахмедова К.Н., Рахимов Б.Г., Махмудов М.Б., ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТРЕВОЖНОСТИ ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ	389
Нуриддинова М.Б, Шоахмедова К.Н., ПРИНЦИПЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СТИРАЕМОСТИ ЗУБОВ	391
Шоахмедова К.Н., Нигматова Н.Р., Убайдуллаева Н.И. ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ ВЫНОСЛИВОСТИ К ЖЕВАТЕЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ ПРИ МОСТОВИДНОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ	394
Эргашев Б.М., Алиева Н.М. "ЦИФРА" ПРИМЕНЕНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ	396
Alimova H.R., Nurullayeva M.O', QALAY FTORIDLI (SNF2) VA NATRIY FTORIDLI (NAF) TISH PASTALARNI TISH BIOPLYONKASIGA TA'SIRINI O'RGANISH	398
Olimov F.O., Quvatov S.Y., Nurullayeva M.O. ZAMONAVIY STOMATOLOGIYADAGI SIRKON DIOKSID KONSTRUKSIYALARNI ANAMIYATI	399
Ибрагимов А.Х. , Акбаров А.Н., ПРОЯВЛЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ РТА ДО И ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ	402
Фархадова Н.В., Ирсадиева Ф. Х. ВЛИЯНИЕ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ НА СОСТОЯНИЯ ЭМАЛИ, ДЕНТИНА И ПУЛЬПЫ	404
Арипов Ш.А. Ризаева С.М. ПЛАНИРОВАНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА ЭТАПЕ ЦИФРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ШАБЛОНА	405
Хайдарова О., Омонова Н.А. ҚОЛИП ОЛИШ УЧУН МИЛКНИ РЕТРАКЦИЯ ҚИЛИШ СИФАТИНИ КЛИНИК-ФУНКЦИОНАЛ БАҲОЛАШ	406
Косимов А.А. Акбаров А. Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОЧАГОВОЙ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ЭМАЛИ ЗУБОВ	408
Рузиева С.С. , С.Т.Эшимова, Хабилов Б.Н. АНАЛИЗ ОПРОСА ПАЦИЕНТОВ О КАЧЕСТВЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЛНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПЛАСТИНЧАТЫМИ ПРОТЕЗАМИ	409
Рузиева С.С. , С.Т.Эшимова, Хабилов Б.Н. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ У БОЛЬНЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СОЗДАНИЯ КРАЯ БАЗИСА ПОЛНОГО СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА	412